


ENSEMBLE, PROTÉGEONS LES NOURRISSONS CONTRE LA COQUELUCHE

QU'EST-CE QUE LA COQUELUCHE ?^{2,3}

Une **infection respiratoire** due à une bactérie :

- *Bordetella pertussis* ou *parapertussis*
- **TRÈS contagieuse**
- Transmise par la toux

À l'origine de quintes
qui peuvent durer
plusieurs semaines



C'est
la toux des
100 jours



Écouter le fameux
« chant du coq »
caractéristique

Les formes graves

peuvent nécessiter une
hospitalisation et entraîner un
décès notamment chez :³

- Les nourrissons (< 6 mois)
- Certaines personnes **fragiles**



Recommandations vaccinales 2020

CONTRE LA COQUELUCHE LA VACCINATION COMME MOYEN DE PRÉVENTION ! *

* Pour plus d'informations, consultez le calendrier des recommandations et vaccinations en vigueur.
1. HAS. Avis n° 2020.0025/AC/SESP du 1er avril 2020 du collège de la Haute Autorité de Santé relatif au maintien de la vaccination des nourrissons dans le contexte de l'épidémie de COVID-19.

2. INSERM. Coqueluche.

3. Santé publique France. Coqueluche-Adultes. Les 5 bonnes raisons de se faire vacciner.

4. Ministère des solidarités et de la santé. Calendrier et recommandations vaccinales 2020. Mars 2020.

5. Gouvernement.fr. Info Coronavirus COVID-19. Comprendre le Covid-19. Mise à jour le dimanche 10 mai 2020.

Avec la participation des sociétés savantes :



Retrouvez la version
numérique du poster en
scannant ce QR Code



ATTENTION !
Toutes les
vaccinations doivent
être maintenues
pendant la pandémie
COVID-19¹

COMMENT SE TRANSMET-ELLE ?^{2,3}

- Par **voie aérienne** via les **gouttelettes** du nez et de la bouche

- Jusqu'à **3 semaines** après le début des symptômes



1 personne
atteinte en contamine
15 en moyenne²



COVID-19 À titre de comparaison

1 personne
atteinte en contamine
3 en moyenne⁵



« Stratégie
du cocooning »
empêcher la transmission
aux nourrissons de moins
de 6 mois^{2,3,4}

Tout l'entourage qui sera en contact
étroit et durable avec le nourrisson
doit être à jour de sa vaccination
coqueluche idéalement avant
la naissance du nourrisson

Créer un cercle de
protection autour des
nouveau-nés

Recommandations vaccinales
coqueluche : Primo-vaccination et
1^{er} rappel du nourrisson à 2, 4 et 11 mois
suivis de rappels à différents âges de la
vie : 6 ans, 11-13 ans et 25 ans.⁴

Êtes-vous à jour de
vos vaccinations ?

Parlez-en à votre
médecin !